



107078, Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 11/1

тел/факс: (495) 661-09-91, 280-03-02, e-mail: rscenr@rscagro.ru

<http://rosselkhozcenter.ru>

**Оперативная информация о результатах обследования фитофтороза
картофеля в Российской Федерации
в летний период 2025 г**



Фитофтороз картофеля — это распространенное грибное заболевание, поражающее картофель. Возбудителем является гриб *Phytophthora infestans*, который активно развивается при температуре 12-25°C и высокой влажности воздуха. Заражения патогеном проявляются в виде бурых, мокнущих

пятен на листьях. С нижней стороны листьев на границе больной и здоровой ткани появляется белый пушистый рыхлый налёт из спор гриба, с помощью которых гриб размножается и распространяется. Листья и стебли буреют и засыхают. На клубнях появляются твёрдые буровато-серые пятна, вдавленные внутрь ткани.

Болезнь наносит серьезный экономический ущерб картофелю, приводя к существенным потерям урожайности — до 70% и более, при этом значительно ухудшается качество клубней. Заболевание вызывает преждевременное увядание и гибель ботвы. Пораженные клубни гниют, теряют товарный вид и становятся непригодными для употребления в пищу.

Фитомониторинг фитофтороза картофеля специалистами филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» в текущем году был проведён на площади 55,40 тыс. га, заражено посадок — 9,31 тыс. га. Обработки проводились на площади 48 тыс. га.

Мониторинг картофеля в Российской Федерации показал, что заражение было отмечено преимущественно в Центральном федеральном округе, где было обследовано 39,03 тыс. га, заражение патогеном составило 7,27 тыс. га посадок. В Южном федеральном округе обследования фитофтороза картофеля были проведены на площади 3 тыс. га, заражение составило 0,24 тыс. га. В

Северо-Западном федеральном округе на наличие фитофтороза картофеля, было обследовано посадок 1,39 тыс. га, заражение составило 0,05 тыс. га. В Северо-Кавказском федеральном округе обследования картофеля на выявление болезни были проведены на площади 5,32 тыс. га, заражение составило 1,59 тыс. га. В Приволжском федеральном округе на наличие патогена было обследовано 3,07 тыс. га, заражение составило 0,06 тыс. га. В Сибирском федеральном округе обследование были проведены на 0,98 тыс. га, заражено площади 0,11 тыс. га.

Фитофтороз поражает картофель на всех этапах развития, поэтому защитные мероприятия должны охватывать весь жизненный цикл развития растений и носить системный характер.

Важную роль в защите картофеля от фитофтороза играют агротехнические мероприятия и использование здорового посадочного материала.

Для минимизации рисков заражения клубней фитофторозом во время уборки и хранения:

- уборку картофеля проводят в сухой теплый день, стараясь минимизировать травмирование клубней;
- предварительно удаляют ботву или проводят финальную фунгицидную обработку;
- перед закладкой на хранение клубни просушивают;
- хранят урожай при температуре – 3-5 С°, относительной влажности воздуха – 90-95 %, хорошей вентиляции хранилища – для минимизации рисков формирования капельной влаги.

Использовать пестициды необходимо строго в соответствии с регламентом применения средств защиты растений, указанном в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации на 2025 год», соблюдая технику безопасности, а также заблаговременно предупредить пчеловодов и население о предстоящих обработках. За консультациями по вопросам фитомониторинга и борьбы с вредными организмами можно обращаться в филиалы ФГБУ «Россельхозцентр», контакты которых можно найти на сайте учреждения по адресу: <https://rosselhoccenter.ru>

Информационный канал учреждения в мессенджере Телеграмм:

«Россельхозцентр – Аграрные новости»

Присоединяйтесь по ссылке

<https://t.me/shcentr>